

Dr. F. Declau

Dr. D. Vanden Abeele

Dr. E. Coen

Dr. K. Berghmans

NEUS - KEEL - OREN

GELAAT- en HALSHEELKUNDE

Behandelend geneesheer:

Tel: dagkliniek 03 285 24 31

E-mail: dagkliniek.svz@gza.be

Website: <http://dagkliniekantwerpen.gza.be>

Sint-Vincentius
Sint-Vincentiusstraat 20
2018 Antwerpen
tel. 03 285 20 00
fax 03 239 23 23

Sint-Jozef
Molenstraat 19
2640 Mortsel
tel. 03 444 12 11
fax 03 444 13 11

www.st-vincentius.be
GasthuisZusters Antwerpen

5200000514 - © SV 18.11.2008

*Sint-Vincentius
Sint-Jozef
GZA . Ziekenhuizen*



Wat u weten moet bij een ingreep voor:

buisjes

(transtympanale drains)

neusamandelen

(adenoiden)

keelamandelen

(tonsillen)

patiënteninformatie

Vorbereiding

Leg uw kind uit wat er gaat gebeuren. Er wordt verwacht dat u de hele tijd bij uw kind blijft. U brengt hem/haar volledig nuchter (niet eten of drinken vanaf middernacht!) en koortsvrij naar de dagkliniek op het afgesproken uur.

U brengt mee:

- uw opnamedocument
- SIS-kaart
- identiteitskaart
- vertrouwd speelgoed
- voorschot

Voor de begeleiders is er koffie of thee beschikbaar.

Ontslag

Het ontslag is voorzien tussen 15.00 en 18.00u voor neusamandelen en/of keelamandelen. Voor buisjes is het ontslag voorzien rond de middag. Het juiste tijdstip is afhankelijk van de instructies van de anesthesist.

U maakt een afspraak voor controle.

Pijnstilling

Na een neus- of keelamandeloperatie is pijn met uitstraling naar de oren een frequent verschijnsel. Uw kind mag 2 tot 3 keer per dag (het best een half uur voor de voeding) een suppo (paracetamol) krijgen tegen de pijn.

Andere medicatie

Eventuele andere medicatie wordt meegegeven, of u krijgt hiervoor een doktersvoorschrift.

Voeding

- Thuis geeft u eerst wat water en wanneer er geen maaglast is (zoals braken of braakneiging) mag uw kind 's avonds een lichte maaltijd hebben.
- U geeft het best een lichte maaltijd zoals yoghurt, pudding, platte kaas e.d. Nadien spoelen van de mond met water (geen bruis).
- Na een neus- of keelamandeloperatie vermijdt u het best alles wat hard, warm, pikant of zuur is.
- Vergeet vooral niet uw kind te stimuleren om te drinken. Voldoende vochtinname is belangrijk.

Werk- of schoolhervatting

Als uw kind koortsvrij is, goed eet en drinkt, dan mag het weer naar school.

Voor neusamandelen is dat meestal na 2 dagen, en voor keelamandelen na 7 dagen.

Aandachtspunten

- Het kind onder rechtstreeks toezicht houden de eerste 24u.
- Extra inspanningen, blootstelling aan de volle zon worden het best vermeden gedurende de eerste 10 dagen.

Bij buisjes:

- Als u het kind een bad geeft of het haar wast, gebruik dan een propje watten met vaseline of nivea doorkneed om het binnen dringen van water in het oor te voorkomen.
- Bij etterige oorloop, altijd de behandelend arts verwittigen.

- Bij problemen neemt u het best contact op met uw huisarts of met de behandelende geneesheer, of kan u terecht bij de wachtdokter van het Sint -Vincentiusziekenhuis (tel. 03 285 20 00)

Urgenties

- Bij helderrood bloedverlies, bij erge pijn of bij aanhoudend braken, dan dient u onmiddellijk de behandelend geneesheer, het dagziekenhuis en/of de spoedgevallen te contacteren.

- BIJ NABLOEDING: VERVOER IN ZIJLIGGING.