

Geachte Heer, Mevrouw,

U verlaat het dagziekenhuis na een ERCP. Met deze folder willen wij u enkele wenken geven die belangrijk zijn na uw onderzoek.

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft aarzel dan niet om contact op te nemen met uw behandelend arts of met het dagziekenhuis.

*Het dagziekenhuis is open
van maandag tot en met vrijdag
van 7.00 u tot 18.00 u
tel. 03/285.20.60*

Sint-Vincentius
Sint-Vincentiusstraat 20
2018 Antwerpen
tel. 03 285 20 00
fax 03 239 23 23

Sint-Jozef
Molenstraat 19
2640 Mortsel
tel. 03 444 12 11
fax 03 444 13 11

www.st-vincentius.be
GasthuisZusters Antwerpen

Wat u moet weten bij een ERCP

patiënteninformatie

Wat is een ERCP

De afkorting ERCP staat voor Endoscopische Retrograde CholangioPancreaticografie. Het is een endoscopisch onderzoek van de galwegen (cholangiën) en de afvoergang van de alvleesklier (pancreas). Endoscopie betekent 'van binnen bekijken': een arts kijkt uw maag en/of darmen van de binnenkant. Dit gebeurt met behulp van een flexibele en bestuurbare kijker, een zogenaamde endoscoop. De endoscoop is een dun buisje, met een doorsnede ter grootte van een eurocent. Het buisje is gemaakt van glasvezels. De endoscoop bevat kanalen die licht en beeld geleiden. Daarnaast kunnen via de endoscoop vloeistoffen naar binnen worden gebracht, en kan de arts via het buisje kleine instrumentjes besturen. Via de endoscoop kunnen kleine ingrepen worden verricht, zoals het wegnemen van stukjes weefsel voor nader onderzoek (biopsie), het opheffen van een vernauwing in de galwegen met behulp van een buisje (endoprothese) of het verwijderen van galstenen uit de galwegen.

Vorbereidingen

- Vanaf 4 uur 's nachts mag u niet meer eten of drinken.
- Antistollingsmiddelen (bijvoorbeeld Marcoumar® of Sintrom®) mogen in overleg met uw arts vanaf een bepaalde periode voor het onderzoek niet meer worden gebruikt.
- Ook ontstekingremmende en pijnstillende medicijnen (bijvoorbeeld Aspirine® of Ascal®) mogen in overleg met uw arts vanaf een bepaalde periode voor het onderzoek niet meer worden gebruikt.

- Indien u diabetes hebt, vraag richtlijnen aan uw arts met betrekking tot het inspuiten van insuline of inname van medicatie op de dag van uw opname.

Wat u zeker moet vermelden

- Allergie voor geneesmiddelen of verdoving.
- Gebruik van medicijnen (vooral antistollingsmiddelen).
- Zwangerschap.

Hoe verloopt het onderzoek

Bij aankomst op de dagkliniek zal een bloedafname gebeuren om de bloedstolling te bepalen, indien dit niet de dag voordien is gebeurd. Tezelfdertijd zal een infuus worden aangekoppeld, waardoor het onderzoek vlot kan plaatsvinden. Tijdens het onderzoek krijgt u een lichte verdoving. Het onderzoek vindt plaats op de afdeling radiografie (RX).

Het instrument wordt voorzichtig via de mond, de slokdarm en de maag tot in de twaalfvingerige darm geschoven. Hier komen de galwegen en de alveesklierafvoergang uit in de dunne darm.

Via de endoscoop wordt een dun slangetje in de galweg en de alveeskliergang geschoven. De meeste ingrepen die via een endoscopie worden verricht zijn niet pijnlijk.

Tijdens een ERCP worden röntgenfoto's gemaakt van de galwegen en de alveesklier. Dit gebeurt om eventuele vernauwingen of galstenen op te sporen. Hiervoor brengt de arts met behulp van een slangetje contrastvloeistof in de afvoergangen. Deze contrastvloeistof veroorzaakt geen bijwerkingen. Soms moet tijdens het onderzoek de uitgang van de galwegen iets vergroot worden met een klein sneetje in de darmwand, op de plaats waar de afvoergangen van de galwegen en de alveesklier bij elkaar komen. Deze ingreep heet papillotomie. U merkt er niets van.

Na het onderzoek

U ontwaakt op de ontwaakzaal. Daarna hebt u nog enkele uren bedrust op de dagkliniek. In de namiddag komt de dokter langs om de resultaten van het onderzoek met u te bespreken.

De invloed van de verdoving kan nog enkele uren duren, waardoor u de dag van de ingreep geen voertuigen mag besturen. Verder mag u de dag na de ingreep uw dagelijkse activiteiten gewoon hervatten.

U laat zich het best begeleiden door een familielid of kennis, die u tussen 17u en 17.30u mag komen afhalen. Bij uw thuiskomst mag u een lichte maaltijd nuttigen.

Bij pijn mag u paracetamol innemen (geen Aspirine® of soortgelijke derivaten!)